

GROWTEC



www.citrus-agro.com

GROWTEC BORO

GROWTEC BORO corresponde a un fertilizante para aplicaciones foliares, corrector de deficiencias de Boro. Fertilizante basado en la tecnología de quelación del Boro por grupos carboxílicos de origen aminoácido. Esta característica le confiere una mejor penetración foliar y asimilación de los tejidos, incrementando su eficiencia de uso y respuesta.

Ingrediente activo

Boro (B): 12% p/v
Aminoácidos: 1,5% p/v
N-orgánico: 0,65% p/v
Boro 100% Activo
Biológicamente

GROWTEC BORO

Grupo

Corrector de carencias de boro



CHILE: Av. Del Valle 524, Huechuraba, Santiago.



PERÚ: Av. General Felipe Santiago Salaverry N° 2490,
dpto. 201 – block 28, Jesús María Lima.



contacto@citrus-agro.com

Grado

Agrícola

Estado físico

Concentrado Soluble, SL

Almacenamiento

Almacenar en lugar fresco

Composición

BORO

Ingrediente	% p/p	% p/v
Boro (B)	10%	12%
Actividad biológica del Boro	100%	100%
Aminoácidos	0.8%	1,5%
Nitrógeno orgánico		0,65 %



CHILE: Av. Del Valle 524, Huechuraba, Santiago.



PERÚ: Av. General Felipe Santiago Salaverry N° 2490,
dpto.201 – block 28, Jesús María Lima.



contacto@citrus-agro.com

Cultivo	Dosis Litros/Ha	Número de Aplicaciones	Momentos de aplicación	Forma de aplicación
Vid Vinífera	1 a 2 lts / há	1 a 2	Inicio de flor - cuaja.	Foliar
Vid de mesa	200-350 c.c / HL	1 a 2	Inicio de flor - cuaja.	
Limonero-Naranjos	150-250 c.c / HL	1 a 2	Desde cuaja en adelante cada 15 días	
Palto	150-250 c.c / HL	1 a 2	Inicio de flor, cuaja y repetir 15 días después de cuaja	
Nogales	100-200 c.c / HL	1 a 2	Inicio de flor, cuaja y repetir 15 días después de cuaja	
Carozos	150-250 c.c / HL	1 a 2	Aplicar en botón Floral, inicio de flor.	
Avellano	150-250 c.c / HL	1 a 2	Cuaja y 15 días después de cuaja.	
Pomáceas	150-250 c.c / HL	1 a 2	Inicio de flor, cuaja y repetir 15 días después de cuaja	
Cerezo	150-200 c.c / HL	1 a 2	Aplicar en botón floral, inicio de caída de pétalos.	
Melón y sandia	250 – 400 c.c / HL	1 a 2	Floración y cuaja	
Arándano frambuesa, frutilla y mora	200-400 c.c / HL	1 a 2	Aplicar Inicio de flor, plena Flor, cuaja.	
Hortalizas	1 a 2 lts /há	1 a 2	Hortalizas de fruto, floración y cuaja	
Tomate, papas	250 – 400 c.c / HL	1 a 2	Floración, cuaja, crecimiento de fruto	
Olivos	150-250 c.c / HL	1 a 2	Inicio Brotación, Inicio Flor	



CHILE: Av. Del Valle 524, Huechuraba, Santiago.



PERÚ: Av. General Felipe Santiago Salaverry N° 2490, dpto.201 – block 28, Jesús María Lima.



contacto@citrus-agro.com