

GROWTEC MAGNESIO

GROW-TEC Magnesio es un fertilizante foliar quelatado orgánicamente con aminoácidos, lo que le confiere una mejor y más rápida respuesta. El grupo amino es absorbido rápidamente siendo fácilmente asimilable por los tejidos vegetales, recuperando la actividad de la clorofila, debido a la acción de los grupos carboxílicos.

- ◇ Aumenta la producción de proteínas
- ◇ Incrementa la fotosíntesis
- ◇ Incrementa la absorción de Mg en un 30%, al ser más eficiente.

Ingredientes activos

Magnesio (MgO) 7,5 % p/v
Aminoácidos 1,8 % p/v
N-orgánico 5% p/v
Carbono orgánico 2,0 % p/v
Magnesio 100% activo biológicamente.

Grupo

Corrector de Carencias de Magnesio.

Grado

Agrícola

Estado físico

Concentrado Soluble, SL



CHILE: Av. Del Valle 524, Huechuraba, Santiago.



PERÚ: Av. General Felipe Santiago Salaverry N° 2490,
dpto.201 – block 28, Jesús María Lima.



contacto@citrus-agro.com

Aspecto

Líquido viscoso de color café.

Densidad

1,5 g/c.c

Ph

10.2

Composición

Ingrediente	% p/p	% p/v
Magnesio (MgO)	5.85%	7,5 %
N-orgánico	5.2 %	5%
Actividad biológica	100%	100%
Aminoácidos	0.8%	1,8 %

Almacenamiento

Almacenar en lugar fresco



CHILE: Av. Del Valle 524, Huechuraba, Santiago.



PERÚ: Av. General Felipe Santiago Salaverry N° 2490,
dpto.201 – block 28, Jesús María Lima.



contacto@citrus-agro.com

Cultivo	Dosis Litros/Ha	Número de Aplicaciones	Momentos de aplicación	Forma de aplicación
Vid vinífera y de mesa	500 c.c / HL	2	15 días antes de pinta	Foliar
Kiwis	400 c.c / HL	3	A partir de caída de pétalos, repetir a los 30, 40 y 50 días de plena flor	
Limonero-Naranjos	300 -500 c.c / HL	2	Flash de crecimiento vegetativo de otoño y primavera	
Palto	300 -500 c.c / HL	2 a 4	Flash de crecimiento vegetativo de otoño y primavera	
Nogales	400 c.c / HL	2	Flujo de crecimiento vegetativo y de frutos	
Carozos	500-600 c.c / HL	3	Desde endurecimiento de frutos	
Avellano	500 c.c / HL	2 a 3	Aplicar desde caja hasta fin decrecimiento de frutos	
Pomáceas	400-500 c.c / HL	2 a 3	Aplicar cada 15 días, en huertos con índices bajos de Mg	
Cerezo	500-600 c.c / HL	3	Aplicar desde caída de pétalos, 3 o 4 aplicaciones cada 7 días.	
Melón y sandía	250 – 400 c.c / HL	3	Aplicar desde 4 a 6 hojas verdaderas	
Arándano frambuesa, mora y frutilla	300 - 400 c.c / HL	3	Aplicar desde inicio de brotación y postcosecha	
Hortalizas	800 - 1000 c.c / HL	3	Aplicar desde 4 a 6 hojas verdaderas	
Tomate	800 - 1000 c.c / HL	2	Aplicar 15 días después de 100% de la emergencia y repetir a los 15 días	
Papas	250 – 400 c.c / HL	2 a 3	Desde floración	



CHILE: Av. Del Valle 524, Huechuraba, Santiago.



PERÚ: Av. General Felipe Santiago Salaverry N° 2490, dpto.201 – block 28, Jesús María Lima.



contacto@citrus-agro.com