



CITRUS TECHNOLOGY

GROWTEC CALCIO

CITRUS TECHNOLOGY

GROWTEC

CALCIO

Fertilizante foliar Calcio basado en ácido de Calcio quelatado orgánicamente con ácidos policarboxílicos con un 30% más de eficiencia.

- ✓ Aumenta la producción de proteínas.
- ✓ Mejora la resistencia al estrés ambiental.
- ✓ Aumenta el transporte de azúcares.
- ✓ Absorción de Ca un 30% más eficiente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CALCIO	
Propiedades Físicas	
Apariencia	Líquido Soluble
Densidad a 20°C	1,32 - 1,38
pH	7,0 - 7,5
Composición Garantizada	
Calcio (Ca)	14% g/l
N-orgánico	7,0% g/l
Aminoácidos	2,0% g/l
Azútre (S)	2,0% g/l
Quelato Orgánico	2,0% g/l
Ácido Ascórbico	0,5 g/l
Ácido Glutámico	1,0 g/l
Selina	0,3 g/l
Polina	1,0 g/l
Albúmina	0,5 g/l
Arginina	1,0 g/l

10lt

Líquido Soluble



CITRUS TECHNOLOGY

Fertilizante foliar Calcio basado en óxido de Calcio quelatado orgánicamente con ácidos policarboxílicos con un 30% más de eficiencia.

- ✓ **Aumenta la producción de proteínas.**
- ✓ **Mejora la resistencia al estrés ambiental.**
- ✓ **Aumenta el transporte de azúcares.**
- ✓ **Absorción de Ca un 30% más eficiente.**

INFORMACIÓN TÉCNICA

CALCIO

Propiedades Físicas		Composición Garantizada	
Apariencia	Líquido Soluble	Calcio (Ca)	14% p/v
Densidad a 20 C°	1,32 - 1,35	N- orgánico	7,0% p/v
pH	7,0 - 7,5	Aminoácidos	2,5% p/v
		Azufre (S)	20% p/v
		Carbono Orgánico	2,0% p/v
		Ácido Aspártico	0,5 gr/lit
		Ácido Glutámico	1,0 gr/lit
		Serina	0,3 gr/lit
		Prolina	1,0 gr/lit
		Alanina	0,5 gr/lit
		Arginina	1,2 gr/lit



CITRUS TECNOLOGY

Cultivo	Dosis	Temporalidad
Manzana	0,5 a 1 L de agua	Aplicaciones de campo: realizar 3 a 6 aplicaciones (6 l/ha) desde el fruto de 2,5 cm repitiendo cada 10 días. Luego, realizar 2 a 4 aplicaciones (9 l/ha) cada 10 a 15 días hasta inicio de cosecha.
	1,3 a 1,4 L/ 100 L agua	Aplicaciones en post cosecha: aplicar durante el baño o la ducha de los bins. Se puede mezclar con DPA.
Uva de Mesa	1 a 1,5 L/ 100 L de agua	Realizar 2 a 4 aplicaciones; la 1era con baya de 4 a 5 mm y las siguientes 5 a 7 días después hasta tinta. Se puede mezclar con las aplicaciones de Ácido giberélico.
Uva Vinífera	1 a 1,5 L/ 100 L de agua	Realizar 2 a 4 aplicaciones desde 1 era Baya de 2 a 3 mm, y repetir cada 5 a 7 días.
Durazno	1 L/ 100L de agua	Realizar 2 a 3 aplicaciones desde 30 días antes de cosecha, cada 10 días.
Mango	1,5 a 2 L/ Ha	Realizar 3 aplicaciones desde floración hasta llenado de fruto.
Calabaza, pepino, Melón	0,3 a 0,5 L/ 100 L de agua	Realizar 2 a 3 aplicaciones desde 30 días antes de cosecha, cada 10 días.
Cítricos	1 L/ 100 L de agua	Realizar 2 a 3 aplicaciones desde fruto recién cuajado, cada 10 días.
Frambuesa, Arándano, Zarcamora	1 L/ 100 L de agua	Realizar 3 a 4 aplicaciones desde fruto en desarrollo intermedio a cosecha.
Fresa	1 a 1,5 L/ 100 L de agua	Realizar 2 a 3 aplicaciones desde fruto en desarrollo intermedio a cosecha.
Tomate, Pimiento	1 a 2 L/ 100 L de agua	Realizar 5 a 6 aplicaciones a partir del cuaje del primer ramillete.
Sandía	0,5 L/ 100 L de agua	Aplicar con fruto recién cuajado y 15 a 21 días después.
Lechuga, Col	1 L/ 100 L de agua	Aplicar 30 y 15 días antes de cosecha.
Apio	1 a 1,5 L/ 100 L de agua	Realizar 5 a 6 aplicaciones cada 15 días desde un 25% de cubrimiento del cultivo.