



ALGAE

INFORMACIÓN TÉCNICA

Observaciones

·U	H	U	٧	n	E	u	
C	0	m	p	o	ik	oi.	Ó

 Aminoácidos
 6,08% p/v

 Potasio
 0,38% p/v

 Nitrogeno orgánico
 0,99% p/v

 Acido Fulvicos
 3,45% p/v

Dosis

Actividad biológica (fitohormonas)

Citoquininas Tr Acido giberélico 0. Acido indel acetico 0. Acido indel butirico 0.

0,933 +/- 0,072 mg/L 0,0578 +/- 0,002 mg/L 0,0485 +/- 0,016 mg/L

Uvas de mesa

prunnus spp

Nogales

Avellano

Cultivo

Citricos y Paltos

Carozos, cerezas y

Berries, arandanos,

frambuesa y frutillas

Desde inicio brotación, hasta llenado de bayas con intervalo de 15 días.

Desde inicio brotación, y repetir cada 15 días, hasta completar 4 aplicaciones.

Desde 30% flor y repetir cada 15 días, hasta completar 4 aplicaciones.

Desde amentos elongados / brotación, repetir cada 15 días hasta completar 4 aplicaciones.

Desde 100% de fioración, repetir a la cuaja (petal fall) y hacer tercera aplicación a lkos 15 días.

Primera aplicación 30 días antes de início de cuaja y repetir 2 veces, cada 15 días.

Producto puede ser aplicado por fertirriego, en dosis de 10 its x há. Mojamiento por há 1000 a 1500 litros.

300 a 500 cc.

por HL de agua

PRODUCTO HECHO EN CHILE



CITRUS LTDA.

Av del Valle 524, Huechuraba, Santiago contacto@citrus-agro.com www.citrus-agro.com

20lt