



**CITRUS-AGRO**

# GROWTEC

## BORO

### Características físico / químicas

|             |            |       |
|-------------|------------|-------|
| Composición | % p/p      | % p/v |
| Boro (B)    | 10         | 12    |
|             | 8,5        |       |
| Densidad    | 1.32 gr/cc |       |

### Dosis recomendada

| Cultivos                          | Dosis L/ ha   | Observaciones                                              |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| Vides                             | 1 a 2 lts/ ha | Inicio de Flor-Cuaja.                                      |
| Pomáceas                          | 1 a 2 lts/ha  | Inicio de Flor, Cuaja y repetir 15 días después de Cuaja.  |
| Hortalizas y cultivos             | 1 a 2 lts/ha  | Hort.de Fruto: Floración y Cuaja.                          |
| Nogales y Avellanos               | 1 a 2 lts/ha  | Inicio de Flor, Cuaja y repetir 15 días después de Cuaja.  |
| Arándanos, frutillas y frambuesas | 1 a 2 lts/ha  | Aplicar Inicio de Flor, plena Flor, Cuaja.                 |
| Carozos                           | 1 a 2 lts/ha  | Aplicar en Botón Floral, inicio de Flor, Caída de pétalos. |

### Metales pesados

|          |         |
|----------|---------|
| Cadmio   | < 1 ppm |
| Plomo    | < 1 ppm |
| Arsénico | < 1 ppm |
| Mercurio | < 1 ppm |

**20**  
**Litros**

**CITRUS TECHNOLOGY**

Dirección: Av del Valle 524,  
Huechuraba, Santiago  
Mail: [contacto@citrus-agro.com](mailto:contacto@citrus-agro.com)