



CITRUS-AGRO



# GROWTEC

## MAGNESIO

Fertilizante foliar Magnesio basado en óxido de Magnesio quelatado orgánicamente con ácidos policarboxílicos con un 30% más de eficiencia.

- ✓ Aumenta la producción de proteínas.
- ✓ Mejora la resistencia al estrés ambiental.
- ✓ Aumenta el transporte de azúcares.
- ✓ Absorción de Mg un 30% más eficiente.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MAGNESIO

| Propiedades Físicas |                 | Composición Garantizada |          |
|---------------------|-----------------|-------------------------|----------|
| Apariencia          | Líquido Soluble | Magnesio (Mg)           | 7,5% p/v |
| Densidad a 20 °C    | 1,5 g/cc        | N- orgánico             | 5% p/v   |
| pH                  | 10,2            | Aminoácidos             | 1,8% p/v |
|                     |                 | Carbono Orgánico        | 2,0% p/v |

20lt

Líquido Soluble

GROWTEC  
MAGNESIO

CITRUS TECHNOLOGY  
Innovación en la agricultura

| Cultivo                                     | Dosis Máxima por L/ha | Nº apls. | Época de aplicación                                                                                                                                                                             | Mojamiento L/ha de agua |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Citricos                                    | 6 L/ha                | 2        | En los flujos de crecimiento de otoño y primavera.                                                                                                                                              | 2.000+                  |
| Palto                                       | 6-7 L/ha              | 2        | En los flujos de crecimiento de otoño y primavera.                                                                                                                                              | 1.500+                  |
| Uva de mesa y vinifera                      | 5 L/ha                | 2        | Desde 15 días antes de pinta hasta inicio de pinta.                                                                                                                                             | 1.000                   |
| Nogales                                     | 4,5 L/ha              | 1        | Durante crecimiento vegetativo y de frutos.                                                                                                                                                     | 800-1.000+              |
| Aumento de sólidos solubles en una vinifera | 4,5 L/ha              | 3        | 1) 15 Días antes de pinta, 1.000<br>2) En pinta.<br>3) 15 Días después de pinta.                                                                                                                |                         |
| Kiwis                                       | 3-3,5 L               | 3        | A partir de caída de pétalos y repetir 30, 40 y 50 días después de plena flor.                                                                                                                  | 800 - 1.200             |
| Berries ( arandano, frambuesa, frutilla)    | 2-3 L/ha              | 3        | Aplicar en brotación y/o post cuaja.                                                                                                                                                            | 400-800                 |
| Pomáceas                                    | 5 L/ha                | 2 - 3    | Aplicar cada 15 días en huertos con niveles bajos de magnesio en análisis foliar, última aplicación a fines de diciembre. En granny Smith realizar 3 a 4 aplicaciones hasta el 30 de diciembre. | 1.000+                  |
| Carozos                                     | 6,5 L/ha              | 3        | Desde endurecimiento de carozo, cada 15 días.                                                                                                                                                   | 1000+                   |
| Hortalzas                                   | 3 L/ha                | 3        | Desde 4 a 6 hojas.                                                                                                                                                                              | 100-200                 |
| Lechugas y Zanahorias                       | 4-8 L/ha              |          | 10 a 14 días post trasplante o emergencia. luego cada 7 a 10 días, según deficiencia.                                                                                                           | 200+                    |
| Cereales                                    | 1,5 L/ha              | 1        | Entre inicio y fin de macolla.                                                                                                                                                                  | 30 - 50                 |
| Papas                                       | 4-8 L/ha              | 2        | 1 semana después del 100% de la emergencia, repetir 14 días después.                                                                                                                            | 100-200                 |