



CITRUS-AGRO



GROWTEC

POTASIO

Fertilizante foliar Potasio basado en óxido de Potasio quelatado orgánicamente con ácidos policarboxílicos con un 45% más de eficiencia.

- ✓ Aumenta la producción de proteínas.
- ✓ Mejora la resistencia al estrés ambiental.
- ✓ Aumenta el transporte de azúcares.
- ✓ Absorción de K+ un 45% más eficiente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

POTASIO

Propiedades Físicas		Composición Garantizada	
Apariencia	Líquido Soluble	Potasio (K ₂ O)	30% p/v
Densidad a 20 °C	1,43 - 1,4	Azútre (S)	20% p/v
pH	6,0 - 6,5	Aminoácidos	2,5% p/v
		N- orgánico	2,0% p/v
		Carbono Orgánico	2,0% p/v
		Ácido Aspártico	0,5 gr/l
		Ácido Glutámico	1,0 gr/l
		Serina	0,3 gr/l
		Prolina	1,0 gr/l
		Alanina	0,5 gr/l
		Arginina	1,2 gr/l

20lt

Líquido Soluble

GROWTEC
POTASIO

CITRUS TECHNOLOGY
www.citrus-agro.com

Cultivo	Concentración aplicación	Dosis máx. por L/ta	Nº apls.	Mejoramiento L/ta de agua	Época de aplicación
Cerezo variedades precoces	100 L/ta	7 L	2 ó 3	1.200 - 2.000 L	1- Inicio de viaje de color de fruto 3- De 7 a 15 días después de la 2da aplicación.
Níni	300 - 500 cc / 100 L	8,0 L	3 ó 4	800 - 1.200	A partir de caída de pétalos y repite 30, 40 y 50 días después de plena flor.
Uva de mesa	500 - 700 cc / 100 L	8,0 L	3 ó 5	1.200 - 1.200 L	Desde brotes de 30 cm en adelante hasta punto si fuera necesario.
Olivo	600 - 800 cc / 100 L	8,0 L	3 ó 4	1.500 +	Comenzar desde brotes de 15 - 20 cm. Repite cada 10 o 15 días especialmente en años de alta producción desde máxima.
Viñedo - 90 TM	500 - 700 cc / 100 L	10,0 L	4 ó 5	1.200 L	Desde brotes de 30 cm en adelante hasta punto si fuera necesario.
Arándanos (frambuesas, frutillas)	350 - 400 cc / 100 L	4,0 L	4	400 - 600	Aplicar de brotes de 15 cm a punto
Duraznos, nectarinas, almendros	350 - 400 cc / 100 L	5,0 L	3 ó 4	1000 +	Desde entumecimiento de carpas, cada 15 días.
Cuscutáceas (ardénas, melones, pepinos de mar)	600 - 700 cc / 100 L	4,0 L	4 ó 5	600 +	30 - 50 días después del trasplante emergencia según sea el caso.
Cítricos D' ager	250 - 350 cc / 100 L	7,0 L	2 ó 3	1.600 +	Desde punto a cosecha.
Ajo, cebolla	600 - 700 cc / 100 L	4,0 L	3 ó 4	400 +	30 y 60 días después del trasplante.
Papas	250 - 300 cc / 100 L	4,5 L	2 ó 3	1.200 +	Aplicar cada 15 días en huertos con riegos tipo de potasio en análisis foliar.
PARAS - 40 TM/HA	1,0 - 1,5 L / 100 L	9,0 L	3 ó 5	300 +	Inicio aplicaciones 2-4 semanas después de 100% de la emergencia y repite cada 7 o 14 días para completar programa.
Cítricos (Clementina, Mandarina, Satsumas, Tangoras, Naranja, Limones y Pomelos)	400 - 500 cc / 100 L	10 L	4 ó 5	2.000 +	1- En los flujos de crecimiento de fruto y primavera. 2- En variedades de alta fructificación y repite 2 a 3 aplicaciones durante la fase 1 del crecimiento de fruto.
Tomate (hasta 140 TM/HA)	700 - 900 cc / 100 L	7,0 L	5 ó 6	600 +	Inicio aplicaciones 20 días post trasplante y repite cada 7 o 10 días hasta completar programa.
Palta	500 - 700 cc / 100 L	8,0 L	3 ó 4	1.200 +	En la fase de crecimiento de primavera y inicio de fruto especialmente en años de alta producción.
Luchugos (manejo para instrumentar para y materia seca)	700 - 800 cc / 100 L	6,0 L	5 ó 6	600 +	Inicio aplicaciones 20 días post trasplante en todo de verano y repite cada 7 o 10 días completar programa.